

Орнитофауна озера Нумто и его окрестностей

Е.Г. Стрельников

Государственный природный заповедник «Юганский».

с. Угут, Сургутский р-н, ХМАО-Югра, 628458, Россия. E-mail: biostrelE@rambler.ru

Поступила в редакцию 2 февраля 2009

Первое упоминание об обследовании окрестностей озера Нумто, из которого вытекает река Надым (правый приток Оби, впадающий в Обскую губу), относятся к июлю 1936 года, когда студент Томского университета собрал коллекцию местных птиц, тушки которых хранятся в коллекции университетского музея (Гынгазов, Миловидов 1977). В дальнейшем орнитологическая информация собиралась попутно специалистами не орнитологами. Все собранные ими данные разрознены и часто недоступны.

Мы проводили орнитологическое обследование рассматриваемой территории в несколько циклов: 1) определение состава орнитофауны во второй половине лета; 2) изучение птиц в осенний период; 3) наблюдения за весенним пролётом птиц; 4) изучение гнездового населения птиц. Основные места наших работ показаны на рисунке.

Первый цикл выполнен 23-26 августа 2004. Обследованы небольшие озёра озёрно-болотной системы Нумто. 23 августа 2004 были проведены авиаучёты на отрезках: город Лянтор – озеро Мевтылор ($63^{\circ}19.8'$ с.ш., $70^{\circ}51.3'$ в.д.), 26 августа – озеро Мевтылор – озеро Айвасынглор ($63^{\circ}37.3'$ с.ш., $70^{\circ}57.7'$ в.д.) – озеро Нумто ($63^{\circ}30.8'$ в.д., $71^{\circ}21.5'$ в.д.) – город Лянтор ($61^{\circ}38.6'$ с.ш., $72^{\circ}12.3'$ в.д.). 23 и 25 августа обследованы угодья озёрно-болотной системы озера Мевтылор. В окрестностях Мевтылора обследованы два небольших озера. Первое ($63^{\circ}20.1'$ с.ш., $70^{\circ}52.4'$ в.д.) имело песчаное дно, второе ($63^{\circ}21.7'$ с.ш., $70^{\circ}50.1'$ в.д.) – торфяное. Маршруты в основном были ориентированы радиально, при обследовании озёр они проходили вдоль береговой линии, чтобы обнаружить птиц, затаившихся среди прибрежной растительности. Протяженность сухопутных маршрутов составила 19.1 км.

Второй цикл работ выполнен 25 сентября 2004 с борта вертолёта Ми-8. Над территорией природного парка «Нумто» обследовано около 100 км водно-болотных угодий, из них примерно 63 км – вдоль береговой линии озёр Нумто, Ай-Васынглор и Вон-Васынглор.

Третий цикл выполнен с 15 по 23 мая 2005. С 15 по 20 мая весенний пролёт птиц наблюдали в окрестностях озера Мевтылор. Здесь определена интенсивность пролёта за условные сутки. С помощью наземных маршрутов проследили закономерности весеннего распределения птиц. С этой целью обследовано 22.5 км угодий. 20 мая проведено авиаобследование на отрезке между озёрами Мевтылор и Нумто, куда мы перелетели для продолжения работ. 21 и 22 мая обследовали как прилегающую к озеру Нумто местность, так и акваторию озера. Авиаобследования Береговой линии озера Нумто 15 мая проведено не было, так как озеро ещё было сковано льдом.

Четвертый цикл исследований выполнен с 14 по 23 июня 2005. 14 июня провели авиаобследование береговой линии озера Нумто с целью обнаружения мест скопления селезней уток, собирающихся для отлёта к местам линьки. С 14 по 17 июня выполняли работы в окрестностях озера Васынглор. Здесь пройдено с учётами 10,6 км. С 17 по 21 июня работали в окрестностях озера Мевтылор. Здесь пройдено 12,5 км. С 21 по 23 июня проводили наблюдения в окрестностях озера Нумто. 22 июня обследовали акватория этого озера (4,6 км) и провели наземные маршруты общей протяжённостью 4,3 км.




Рис. 1. Окрестности озера Нумто, где велись полевые работы.

Условные обозначения: 1 – озеро Мевтылор, 2 – озеро Нумто 3 – озеро АйВасынглор.

В соответствии с орнитогеографическим районированием Западной Сибири (Гынгазов, Миловидов 1977) Белоярский район Ханты-Мансийского автономного округа, где расположен природный парк «Нумто», относится к Нижнеобскому участку. Территория самого природного парка относится к Надым-Пуровской орнитогеографической провинции, отличающейся исключительной равнинностью и обилием озёр. Среди равнины резко выделяются речные долины, отороченные узкими (до 3 км) лентами лесов, протянувшихся на сотни километров.

Согласно А.М.Гынтазову и С.П.Миловидову (1977), Нижнеобскому участку свойственно 145 форм птиц, причём главную роль в населении играют лесные формы, а околоводные и водоплавающие птицы отходят на второй план. Однако нам кажется, что значение лесных форм этими авторами преувеличено, так как по площади, а следовательно и по численности птиц, болотные сообщества заметно превосходят лесные. Свыше 40 форм, в том числе *Anas platyrhynchos*, *A. clypeata*, *Aythya ferina*, *Bucephala clangula*, *Mergus albellus*, *Milvus migrans*, *Accipiter nisus*, *Lyrurus tetrrix*, *Tetrao urogallus*, *Tetrastes bonasia*, *Tringa nebularia*, *Actitis hypoleucos*, *Gallinago gallinago*, *Cuculus canorus*, *C. saturatus*, *Strix nebulosa*, *Aegolius funereus*, *Garrulus glandarius*, *Nucifraga caryocatactes*, на Нижнеобском орнитогеографическом участке находят северный предел своего распространения. В то же время здесь не гнездятся *Gavia adamsii*, *Anser albifrons*, *A. erythropus*, *Branta bernicla bernicla*, *Polysticta stelleri*, *Eudromias morinellus*, *Arenaria interpres*, *Eremophila alpestris flava*, *Calcarius lapponicus*, *Plectrophenax nivalis* и др. (всего 30 форм), гнездящиеся на северных орнитогеографических участках. Нижнеобской участок отличается большим количеством фоновых видов, причём *Anas acuta*, *Tetrao urogallus*, *Tringa glareola*, *Fringilla montifringilla*, *Acanthis flammea*, *Phylloscopus trochilus*, *Ph. borealis*, *Motacilla flava*, *Emberiza pusilla* и ряд других встречаются здесь в большом количестве.

За время полевых работ обследованы основные биотопы, представленные на территории природного парка «Нумто». Всего нами отмечено 92 вида птиц. Окончательный список птиц, составленный после опроса местного населения, насчитывает 101 вид. Большую помощь в определении характера пребывания местных птиц оказал инспектор природного парка Андрей Кузмич Вылла.

Gavia stellata. Немногочисленна. Местные жители утверждают, что краснозобая гагара относится к гнездящимся видам, но достоверных данных не имеется. Группа из 4 негнездящихся птиц отмечена нами только в июне на озере Нумто.

Gavia arctica. Чернозобая гагара – достаточно обычный и широко распространённый вид. В гнездовое время заселяет все пригодные для гнездования озёрки, встречается как на крупных (где кормится), так и на мелких (гнездовых) водоёмах. Весенний пролёт проходил в конце мая. В июне пары распределялись по небольшим озёркам и занимали их для гнездования. В окрестностях озера Васынглор 16 июня найдено гнездо с кладкой из 2 яиц на первых стадиях насиживания. В конце августа гагары ещё держались семьями или поодиночке, скоплений не образовывали. На озере-спутнике Мевтылор пара водила одну молодую птицу.

Podiceps auritus. Единичные красношейные поганки отмечены на пролёте в конце мая.

Branta bernicla. Одну чёрную казарку из стаи белолобых гусей в середине 1990-х (точная дата не известна) добыл местный житель М.Вылла на озере Нумто.

Rufibrenta ruficollis. Краснозобая казарка – самый поздно пролетающий гусь. По словам коренных жителей, весенний пролёт хорошо выражен и приходится на первую половину июня. Осенний пролёт не выражен. Нами в ходе полевых работ не отмечена.

Anser albifrons. Белолобый гусь в районе исследований обычно бывает на пролёте. В мае 2005 г. пролёт наблюдался с 16-го по 18-е. За одни условные сутки над наблюдательным пунктом пролетело 438 особей. Преобладающее направление пролёта северное. Местные жители утверждают, что однажды около десятка белолобых гусей в июле линяли на озере Нумто. 25 сентября 2004 стая из 80 птиц отмечена на озере Нумто; около 100 птиц – на озере Вон-Васынглор; 5 белолобых гусей держалось на озере Ай-Васынглор. Миграция продолжалась до 3 октября, наиболее многочисленной была первая волна, приходившаяся на 21-24 сентября.

Anser erythrorus. Пискулька, по словам коренных жителей, регулярно встречается на пролёте в совместных стаях с белолобыми гусями, но самостоятельных их группировок не отмечали. Тестирование показало, что местные жители, по крайней мере те, с которыми нам пришлось работать, этот вид отличают.

Anser fabalis. Гуменник отмечен нами в мае, на пролёте. По сведениям местных жителей, он гнездится в районе озера Нумто. В 20-х числах мая они находили гнезда с кладками в северной части озера.

Chen caerulescens. В последние годы местные жители стали отмечать белых гусей на весеннем пролёте. Так, в мае 2004 г. стаю примерно из 50 птиц видели над озером Нумто, а ещё 10 гусей – в верховьях Надыма.

Synnis olot. Известны единичные залеты лебедя-шипуна. С.Н.Гащев (1998) сообщает о летней встрече 3 птиц, нам местные жители рассказывали об осенней встрече 2 шипунов. Возможно, речь идёт о разных встречах.

Synnis synnis. Лебедь-кликун немногочислен. Местные жители указывают на его гнездование в регионе. Нами в небольшом количестве отмечен на пролёте и в незначительном числе летом, возможно, на гнездовании. Весной, когда озёра ещё скованы льдом, между отдельными парами наблюдались регулярные столкновения, доминирующие самцы изгоняли вновь прилетающие пары с мест, освободившихся ото льда. Подобное поведение неполовозрелых пар характерно для малопродуктивных угодий. В кормных местах они ведут себя го-

раздо более терпимо друг к другу. В первой половине лета мы встречали только неполовозрелых птиц, а в конце августа встреч не зафиксировано вовсе. В сентябре 4 кликуна наблюдались на небольшом озерке между озёрами Нумто и Ай-Васынглор.

Sygnis bewickii. Малый лебедь – редкий на пролёте вид. Нами пара этих птиц была отмечена с вертолётa на небольшом лесном озерке южнее Нумто 25 сентября 2004. Они держались вместе с парой кликунов, что позволило их идентифицировать.

Tadorna tadorna. Залётный вид. Нам рассказывали о добыче в окрестностях озера Нумто утки, «гнездящейся в норах». Но подробности неизвестны.

Anas platyrhynchos. Крайне редка. Нами встречена только на пролёте в мае.

Anas crecca. Чирок-свистунок – обычный, широко распространённый вид. Отмечен на всех этапах работы. Явные предпочтения отдаёт озерам мочажинно-озёрного комплекса бутристых верховых болот, с околотоводной растительностью. В мае свистунки держатся парами. В июне с началом инкубации самки становятся незаметными, а значительная часть самцов отлетает к местам линьки. Отдельные самцы могут линять в местах гнездования. В августе с подъёмом молодых на крыло взрослые самки приступают к линьке и ведут скрытный образ жизни. Молодые одного выводка продолжают держаться вместе. В конце августа – начале сентября чирки объединяются в стаи, начинается их отлёт к местам зимовок.

Anas formosa. Залётный вид. Сразу несколько человек сообщили нам о том, что они добывали в разные годы одиночных самцов.

Anas penelope. Для болотно-озёрных сообществ связь менее характерна, чем для обширных речных долин. В условиях водно-болотного угодья «Нумто» больших скоплений не образует. Отдельные пары отмечены нами в мае и июне. В августе на небольших озерах наблюдались небольшие группы по 3-5 птиц, скорее всего, это особи одного выводка. Такие группы встречали на маленьких озерах-лужах с околотоводной растительностью и торфяными отложениями. Местные жители утверждают, что им доводилось добывать осенью «странного» самца в брачном наряде.

Anas asita. Шилохвость – самый характерный вид болотно-озёрных местообитаний. В водно-болотном угодье «Нумто» предпочитает водоёмы с торфяным дном и выраженной околотоводной растительностью. Прилетает рано, когда озёра ещё скованы льдом. Брачных скоплений нескольких самцов вокруг одной самки не отмечено, большинство птиц держится парами. Самцов встречали и в июне, когда самки приступили к насиживанию. По времени летний тур работ должен был совпасть с появлением птенцов, но мы не встретили ни одного выводка.

Напротив, ещё встречались шилохвости, которые держались парами, хотя количество самцов заметно сократилось, поскольку большая часть их уже отлетела к местам линьки. Во второй половине августа местные шилохвости объединяются в большие стаи, по несколько десятков птиц, и начинается отлёт к местам зимовок. Во время облёта озёра Нумто 26 августа 2004 мы отметили скопление, насчитывающее 70 птиц. В этот же день на отрезке Нумто – Лянтор отмечено несколько стай в 50-100 шилохвостей. Подобные стаи были отмечены и в других районах Сургутского района. Например, в Обской долине держались стаи, насчитывающие до 150 птиц. В сентябре основная часть шилохвостей покинула регион. 25 сентября на озере Нумто отмечено только 7 птиц.

Aythya fuligula. В мае пары хохлатых чернетей, часто объединяющиеся в группы, появились с началом освобождения озёр от льда. Весной эта утка чаще всего попадалась нам на окружённых лесом небольших озёрках в окрестностях озера Нумто. Возможно, это объясняется тем, что большая часть самого озера Нумто в мае не была полностью свободна от льда, и ветер постоянно перегонял льдины от одного берега к другому, образуя огромные торосы. В июне *A. fuligula* выпала из учётов, мы нигде её не встретили, хотя местные жители рассказывали нам о её гнездовании. Но в августе 2004 г. мы встречали как хорошо летающих молодых птиц из ранних выводков, так и птенцов, ещё не способных к полёту и, судя по единичным встречам, скрытно державшихся среди кочек у воды. 26 августа при облёте озера Нумто отмечена стая в 30 птиц. В сентябре хохлатые чернети с борта вертолёта не отмечены.

Bucephala clangula. Обязательным условием гнездования гоголя является наличие дуллистых деревьев или искусственных гнездовий (дуплинок). В мае на небольших озёрках, свободных от льда, встречались одиночные самки. Одиночные самцы держались на полыньях озера. Пара отмечена только однажды – 18 мая, птицы прилетали со стороны болот для вечерней кормёжки на полынью одного из озёр-спутников Мевтылора. В июне самок не встречали, но одиночного самца видели на озёрке в районе озера Ай-Васынглор. Осенью гоголей не отмечали.

Melanitta nigra. Синьга – обычный в регионе гнездящийся вид. Отмечена только на озёрах с песчаным дном. Весной пролёт начался после освобождения озёр от льда. 18 мая у озера Мевтылор в северо-восточном направлении пролетела стая из 30 птиц. В окрестностях озера Нумто и на самом озере 22 мая встречали стаи по 7-10 пар. В июне встречи стай прекратились, встречались только отдельные пары. В августе синьги держались выводками, самки водили по 7-8 молодых. В семьях, где молодые поднялись на крыло, самки интенсивно линяли. Из-за утраты большого количества перьев, как контурных,

так и маховых, в середине августа они не были способны к полёту, поэтому прятались среди кочек у уреза воды. В сентябре синьга из региона исчезает.

Melanitta fusca. Очень редкий на пролёте вид. Коренные жители встречали по 1-2 турпана давно и не каждый год. Нами не отмечен.

Mergus albellus. Обязательным условием гнездования лутка является наличие дуплистых деревьев или искусственных гнездовий. В мае на небольших озерах встречали отдельные пары. Одну пару (самца и самку) видели 15 мая 2005 на свободном ото льда небольшом озере у озера Мевтылор. Ещё одну пару встретили на небольшом озере у озера Нумто. В дальнейшем пары перемещаются в лесные сообщества, где ведут себя очень скрытно.

Mergus serrator. Местные жители утверждают, что длинноносый крохаль регулярно гнездится в окрестностях озера Нумто по таёжным речкам. Гнездовое поведение нами не отмечено. В мае в окрестностях озера Нумто это был обычный вид. Здесь мы встречали отдельные пары, как южнее озера, так и севернее. У озера Мевтылор не отмечен. В первой половине лета 2005 и в конце лета 2004 года мы не встречали длинноносого крохали ни в одной из точек наших работ.

Pandion haliaetus. Гнездится. У озера Мевтылор гнездовая пара прилетела 18 мая. Самец прилетел с северо-востока в 8 ч 50 мин, а в 9 ч 28 мин появилась самка, которая летала на высоте около 30 м по кругу за самцом, который с её появлением стал токовать на высоте около 200 м. В августе скопа отмечена у озера Мевтылор. Один раз птица летела с рыбой в глубь болотного массива. Второй раз (через сутки) скопа пролетала над озером.

Circus cyaneus. Статус не определён. Как самки, так и самцы полевого луна отмечены на весеннем пролёте у озёр Нумто и Мевтылор. Летом и осенью не отмечен.

Circus macrogys. Статус не определён. У озера Мевтылор в середине мая был выражен пролёт самок степного луна; возможно, самцы пролетели раньше. В гнездовое время и осенью не отмечен.

Accipiter gentilis. По словам местных жителей, тетеревиатник гнездится в исследуемом районе. Нами он отмечен только в конце августа. Пролетавшую в пойме речки Мевтыайехан молодую птицу прогонял дербник.

Buteo lagopus. Пролётный вид. Весной к 15 мая пролёт завершился, и зимняки нигде летом не встречались. Осенний пролёт идёт в сентябре – начале октября. 25 сентября один отмечен на озере Нумто.

Buteo buteo. Гнездится. Нами канюк отмечен 17 мая в болотно-озёрной системе Мевтылор. Птица летела в южном направлении. Летом и осенью не встречен.

Haliaeetus albicilla. Гнездится. На весеннем пролёте не отмечен. На болоте западнее озера Нумто 14 июня с вертолётá видели в гнезде двух крупных птенцов в светлом пуху. А 17 июня один взрослый орлан-белохвост носил корм к озеру Мевтылор. На следующий день он держался на восточном берегу этого озера. В августе молодая птица отмечена с борта вертолётá у одного из озёрков недалеко от озера Нумто. 25 сентября одна молодая птица отмечена на северном берегу озера Нумто.

Falco subbuteo. Статус не определён, возможно гнездование. Отмечен только в гнездовое время (июнь) в окрестностях озера Мевтылор.

Falco columbarius. Статус не определён. Одиночных дербников видели в окрестностях озера Мевтылор весной и в конце августа. Летом не встречен.

Falco vespertinus. Статус не определён. Токование самца наблюдал 15 мая в районе озера Мевтылор. Летом кобчик не отмечен, но в конце августа здесь же видели взрослых самца и самку вместе и по отдельности. В других точках работ этот вид не встречен вообще.

Lagopus lagopus. Гнездящийся вид. Белая куропатка встречалась нам во все сезоны и во всех точках работ. Весной самцы активно токовали и сопровождали самок.

Lyrurus tetrix. Гнездящийся вид. Токование самцов отмечено нами только в окрестностях озера Мевтылор, как весной, так и осенью. На токах собиралось по 2 самца. В других точках тетерев не отмечен.

Tetrao urogallus. Гнездящийся вид. Косвенные данные, а именно большое количество старых и новых слопцов, в одном месте сразу около двух десятков, говорят о том, что глухарь обычен в указанном районе. Но весной в окрестностях озера Мевтылор токовал только один самец, к которому прилетали 3 самки. 20 мая видели самца, привлечённого в деревню Нумто. Возможно, особенностью 2005 года было низкое воспроизводство этого вида, зафиксированное всюду в Среднем Приобье. Этим объясняется то, что летом здесь не встречен ни один выводок, а самки держались, объединившись в группы. Осенью 2004 года две птицы (молодые самец и самка) отмечены на участке бутристого болота у озера Мевтылор.

Gruis grus. Гнездится. Отмечен на весеннем пролёте у озера Мевтылор (19 мая). 21 мая с ближайших к деревне Нумто болот доносились голоса серых журавлей. В июне журавли отмечены в окрестностях озера Ай-Васынглор. Здесь слышали голоса и видели пролетающую птицу. В конце августа отмечена некоторая концентрация семей (5) серых журавлей вокруг озера Нумто. Ещё две семьи отмечены на некотором удалении от озера Нумто. В сентябре журавли улетели.

Porzana porzana. Вероятно, гнездящийся вид. Активное токование отмечено в середине июня в окрестностях озера Ай-Васынглор.

Pluvialis squatarola. Возможно, из-за того, что тулес прилетает в район наших исследований рано, в ходе весеннего цикла работ он нами не отмечен, так как весенний пролёт уже завершился. В первой половине лета пара тулесов отмечена около озера Ай-Васынглор на участке плоско-бугристого верхового болота. Птицы явно гнездились. Из-за ограниченности времени нам не удалось найти гнездо, но тулеса все дни работы держались на одном участке и при нашем появлении выражали беспокойство.

Charadrius hiaticula. В августе 2004 года одного галстучника мы вспугнули на берегу озера Нумто. 22 мая 2005 одна птица отмечена на песчаном берегу обмелевшего озера севернее Нумто. Птица улетела в северном направлении.

Tringa ochropus. Черныш отмечен в мае, на пролёте, одна особь пролетела в северном направлении. Других встреч нет.

Tringa glareola. Фифи обычен и на пролёте, и на гнездовании. В ходе весеннего цикла работ этот кулик отмечался повсеместно. Самцы токовали на протяжении целых суток. 15 июня в окрестностях озера Ай-Васынглор найдено гнездо с полной кладкой сильно насиженных яиц. Самец и самка отловлены и окольцованы. А через неделю в окрестностях озера Нумто взрослые птицы выражали активное беспокойство, характерное для пар, сопровождающих выводки. В конце августа при прохождении наземных маршрутов данный вид отмечен не был. В то же время в ночные и утренние часы были слышны голоса пролетающих фифи. Две птицы пытались остановиться для отдыха у водоёма (амбара) возле буровой.

Tringa nebularia. Гнездится. Предпочитает озёра с древесной растительностью по берегам. Таким условиям отвечали окрестности озера Мевтылор. Здесь токование и спаривание больших улитов наблюдали в середине мая в южной части одного из озёр-спутников. В июне пара держалась на этом же участке. Так как улит покидает регион в конце июля, то уже в августе здесь не встречается, поэтому и не отмечен.

Tringa erythropus. Пролётный вид. Местные жители шёголя не знают. Л.Г.Вартапетов (1998) считает его в Обь-Пуровского междуречья гнездящимся в верховьях реки Пякупур (этот район прилегает к водно-болотному угодью «Нумто» с востока). Нами шёголь отмечен только на весеннем пролёте в окрестностях озера Мевтылор. Очевидно, к третьей декаде мая пролёт прекратился, так как в окрестностях Нумто в 20-х числах он уже не встречался.

Philomachus pugnax. Турухтан отмечен в мае, на пролёте у озера Мевтылор (две стаи из 20 и 11 птиц). Токование нами не отмечено. Местные жители утверждают, что в мае 2005 года турухтаны в окрестностях Нумто не задержались и прошли транзитом, но обычно они здесь гнездятся.

Calidris minuta. Пролётный вид. 22 июня 2004 на одном из озёрков севернее озера Нумто отловлен взрослый кулик-воробей. Он отдыхал после миграционного броска. Птица имела брачный наряд, наседных пятен не было. 24 августа на одном из небольших озёрков севернее Мевтылора видели 5 отдыхающих птиц. Днём они спали на отмели.

Calidris alpina. Гнездится. В мае на пролете отмечен не был. Гнездовое поведение наблюдали в середине июня в окрестностях озера Ай-Васынглор на участке плоско-бугристого болота.

Limnoscryptes minimus. Статус не определен. В мае наблюдалось токование одиночных самцов у озера Мевтылор. В другое время этот вид не отмечен.

Gallinago gallinago. Гнездящийся вид, предпочитающий сырые травянистые участки болот. Весеннее токование самцов отмечено в окрестностях поселка Нумто и у озера Мевтылор. Летнее посещение окрестностей озера Ай-Васынглор, показало, что и здесь бекасы токуют, предпочитаемая держаться на мочажинах вокруг озёр. В конце августа две одиночные птицы отмечены на согре близь буровой в окрестностях озера Мевтылор. Одна птица отмечена с борта вертолёта, облетавшего на малой высоте озеро Нумто.

Numenius phaeopus. Гнездится, предпочитает рямовые участки грядово-мочажинно-озёрных комплексов верховых болот. В мае активное токование, сочетающееся с пролётом, наблюдалось в окрестностях озера Мевтылор. У озера Нумто такого активного токования не отмечено, здесь токовали лишь одиночные самцы. На участках плоско-бугристых болот в окрестностях озера Ай-Васынглор средний кроншнеп в июне отмечен не был. В то же время в окрестностях озера Мевтылор при появлении учётчиков пары выражали беспокойство на гнездовых участках. Самцы изредка продолжали токовать. В августе нами этот вид не отмечен. Известно, что взрослые самки покидают район гнездования в первых числах июля, а самцы – несколькими днями позже. Молодые улетают с подъёмом на крыло (начало-середина августа), вслед за родителями, хотя известны единичные задержки молодых средних кроншнепов до сентября.

Limosa lapponica. Пролётный вид, гнездовой статус, на который указывают местные жители, не подтверждён, хотя Л.Г.Вартапетов (1998) сообщает о его гнездовании в верховьях реки Пякупур. Нами малый веретенник отмечен только на пролёте в мае (Мевтылор и Нумто).

Stercorarius parasiticus. Гнездящийся вид. Выраженного весеннего пролёта не наблюдали. Короткохвостый поморник отмечен нами только на гнездовании в окрестностях озера Ай-Васынглор. Здесь он был обычен, видели даже группы из 4 птиц. 16 июня найдено гнездо с 2 яйцами на средних стадиях инкубации.

Larus argentatus. Пролётный вид. Нами 25 сентября 10 птиц отмечены на озере Вон-Васынглор. Местные жители утверждают, что у местных крупных белоголовых чаек верх тёмный.

Larus heuglini. Статус не определён. К моменту начала весеннего цикла работ в мае миграция половозрелых птиц была завершена. Отмеченные в это время птицы, скорее всего, были предвзрослыми, не размножающимися особями, встречались по 1-3. В июне численность халей была заметно меньше весенней. В августе эти чайки были более заметны, наблюдали единичных взрослых, а молодых – по 1-3 птицы. Севернее озера Мевтылор на одном из озерков взрослый халей сопровождал молодого. В озерной системе Нумто встречали одиночных птиц, пары и выводки. 25 сентября на озере Нумто не отмечен.

Larus sialis. Обычный гнездящийся вид. К моменту начала весенних работ в мае миграция половозрелых сизых чаек была завершена. 20 мая один из жителей Нумто принёс 1 яйцо, по его словам, птицы только приступили к откладке яиц. В июне гнездовое поведение отмечено у озера Мевтылор и Ай-Васынглор. В августе в болотно-озёрной системе Нумто больших скоплений не отмечено. Чайки держались по 1-3 птицы. 25 сентября 11 сизых чаек отмечено на озере Нумто.

Sterna paradisaea. Статус не определён. У озера Мевтылор 20 мая одна птица пролетела в южном направлении. 22 июня 10 полярных крачек кормились на озере Нумто. Местные жители говорят, что они гнездятся на плоских озёрно-бугристых болотах севернее озера Нумто и на озеро прилетают только кормиться.

Cuculus canorus. Обычна. Нами кукушка отмечена в первой половине лета во всех точках работ.

Asio flammeus. Обычна. На весеннем пролёте отмечены одиночные болотные совы у озера Мевтылор 15 мая. В конце августа одиночные птицы отмечены севернее озера Мевтылор.

Surnia ulula. Гнездится. Нами ястребиная сова отмечена 17 июня только у озера Мевтылор. Птица летела с севера.

Jynx torquilla. Статус не определён. По данным А.М. Гынгазова и С.П. Миловидова (1977), вертишейка найдена у Нумто и на реке Казым. Нами не отмечена.

Dendrocopos major. Гнездящийся вид. В условиях парка Нумто высокой численности большой пёстрый дятел не достигает, так как площадь лесов незначительная, преобладают болотные массивы. Кроме того, в условиях средней тайги в зимнем питании большого дятла доминируют семена обыкновенной сосны, которая с продвижением на север замещается лиственницей.

Picoides tridactylus. Гнездящийся вид. В мае токование самцов отмечено во внеучётное время у озера Мевтылор. Других сведений о трёхпалом дятле не имеется.

Hirundo rustica. Статус деревенской ласточки не определён. 18 мая одна птица некоторое время летала над рекультивированной буровой площадкой в окрестностях озера Мевтылор и улетела в западном направлении. О гнездовании этого вида в посёлке Нумто данных у нас не имеется.

Eremophila alpestris. Многочисленный на пролёте вид. На весеннем пролёте стаи насчитывали от нескольких особей до нескольких десятков птиц. Осенью рогатый жаворонок нами не встречен, так как его пролёт идёт в более поздние сроки (октябрь-ноябрь).

Anthus hodgsoni. Гнездится. По данным Л.Г.Вартапетова (1998), пролёт зелёного конька больше характерен для крупных рек меридионального направления и в меньшей степени для Обь-Пуровского междуречья. За время выполнения нами учётных работ высокая численность вида не отмечена. Всего несколько птиц держались в окрестностях озера Мевтылор в августе в ернике вдоль речки Мевтайехан. В весенне-летний период не встречен.

Anthus pratensis. Обычный гнездящийся вид. Отмечен нами в характерных для вида местах, во всех точках, где переувлажнённые участки бугристых болот хорошо представлены. Прилёт лугового конька проходил в середине мая. 14 июня в окрестностях озера Ай-Васынглор найдено гнездо с 5 яйцами. 16 июня в нём шло вылупление. На осеннем пролёте этот конёк достигал высокой численности.

Anthus cervinus. Пролётный вид. Весенний пролёт в мае был слабо выражен. Нами отдельные пары отмечены во всех точках работ. С 23 по 26 августа краснозобый конёк был одной из самых многочисленных птиц. Встречали как одиночных, так и группы по 5-8 особей.

Motacilla flava. Одна из самых многочисленных птиц, гнездящихся на болотах. В болотно-озёрной системе озера Вон-Васынглор в середине июня мы нашли несколько гнёзд с полными кладками из 5-6 яиц на последних стадиях инкубации. Время осенних работ совпало с завершением миграции, поэтому нам встречались только одиночные птицы на старой буровой к северу от озера Мевтылор.

Motacilla citreola. Пролётный вид. Как на весеннем, так и на осеннем пролётах отмечены только одиночные птицы на старых площадках буровых в окрестностях озера Мевтылор. Коренные жители утверждают, что желтоголовая трясогузка весной регулярно пролетает в регионе в небольшом количестве. Осенние встречи местные жители охарактеризовать не могут, так как вид становится для них трудноотличимым от *M. alba*.

Motacilla cinerea. Нами статус горной трясогузки не определён. На весеннем пролёте самец отмечен в окрестностях озера Мевтылор. В середине августа здесь же встретили две птицы. В гнездовое время горных трясогузок здесь не видели.

Motacilla alba. Гнездящийся вид. В мае наблюдался пролёт небольшого числа белых трясогузок. Часть из прилетевших птиц уже разбилась на пары и была занята поиском мест для гнезда. В июне на озере Мевтылор найдено гнездо с 2 птенцами в возрасте около 7 сут и 2 яйцами. Гнездящиеся пары были отмечены и в посёлке Нумто. В конце августа на одной из старых буровых к северу от Мевтылор белая трясогузка оказалась самым многочисленным видом. В течение дня здесь кормилось до 50-70 особей. В других точках работ и при учёте с воздуха подобных скоплений больше не обнаружено. Белых трясогузок встречали везде, но по 1-4 птицы.

Lanius excubitor. Гнездящийся вид. В июне мы отметили серого сокопуга в берёзовом криволесье вдоль ручья, соединяющего озеро Ай-Надым с озерком, не имеющим названия. Птица атаковала серую ворону, проявляя территориальные права на участок. Выводок обнаружить не удалось.

Nucifraga caryocatactes. Гнездящийся вид. Во время наших исследований кедровка высокой численности не достигала, возможно, из-за невысокого урожая кедра в парке Нумто. Встречали лишь небольшие группы из 2-5 птиц по кедрочам на буграх и вдоль узких пойм таёжных ручьёв и речек. В гнездовое время вела себя скрытно. Не отмечена она только вокруг озера Ай-Васынглор, где нет кедровников.

Corvus corax. Гнездящийся вид. Высокой численности в условиях озерно-болотной системы Нумно у серой вороны не отмечено. Как с вертолёта, так и на земле мы встречали почти исключительно пары. Скоплений нигде не отмечено.

Corvus corax. Ворон в Ханты-Мансийском округе достаточно обычный гнездящийся вид, однако в условиях парка Нумто он оказался исключительно редким. Одну птицу видели с вертолёта, крик второй слышали у озера Мевтылор. 25 сентября одна отмечена у озера Нумто.

Bombus garrulus. Гнездящийся вид. В год наших исследований высокой численности не достигал. Свиристеля отмечали во всех местах, где достаточно много леса.

Sylvia sibilatrix. Гнездящийся вид. Поющие славки-завирушки отмечены в мае у посёлка Нумто и у озера Мевтылор.

Phylloscopus trochilus. Гнездящийся вид. В гнездовое время весничка была достаточно обычной в лесных сообществах, кроме того, её встречали в глубине болотных массивов, лишённых древесной растительности, среди ерника. На осеннем пролёте немногочисленна, но встречалась регулярно.

Phylloscopus collybita. Гнездится. Предпочитающая высокоствольные леса теньковка в наших условиях малочисленна. Весенний пролёт был выражен слабо. В мае отмечали пение единичных птиц. В июне самцы, поющие на гнездовых участках, отмечены в Нумто и у озера

Мевтылор. В точке у озера Ай-Васынглор этот вид не отмечен. Осенний пролёт сильно растянут. Послегнездовые кочёвки сразу переходят в миграцию и начинаются в июле. Пролёт продолжается до октября (по крайней мере, в отдельные годы). Обычно в конце миграции встречаются взрослые самки, задержавшиеся из-за позднего завершения повторных циклов гнездования и, вследствие этого, задержки послебрачной линьки, в ходе которой в местных условиях они на время утрачивают способность к полёту по причине одновременного выпадения сразу нескольких маховых.

Phylloscopus borealis. Обычный гнездящийся вид. Прилетает в регион в начале июня, поэтому в мае нами не отмечена. Таловка была достаточно обычной у озера Ай-Васынглор в берёзовом криволесье.

Phylloscopus inornatus. Гнездящийся вид. Волнующаяся на гнездовом участке пара отмечена нами в берёзовом криволесье одного из ручьёв в окрестностях озера Ай-Васынглор. В другое время и в других точках зарничку мы не встречали.

Oenanthe oenanthe. Гнездящийся вид. В нашем регионе каменка предпочитает нарушенные ландшафты. Так, в мае пара держалась на озера Мевтылор, в то же время ещё продолжался пролёт отдельных особей. В конце мая названная пара приступила к гнездостроению, облюбовав нишу между пластов торфа на буровой площадке. В июне в гнезде было 6 птенцов. У одного птенца отмечены признаки уродства. Другая пара каменок наблюдалась в посёлке Нумто. Только одна из встреченных нами в гнездовое время пар держалась на ненарушенном участке бугристого болота в северной части озера Нумто (22 июня). В конце августа одна молодая птица отмечена нами на рекультивированном участке у озера Мевтылор. Взрослых особей уже не было. В это время каменки начинают миграцию.

Phoenicurus phoenicurus. Возможно гнездящийся вид. Нами отмечен поющий самец 17 мая (у озера Мевтылор). Другой раз пение горихвостки здесь слышали 20 мая. Других сведений нет.

Luscinia svecica. Пролётный вид. Весенний пролёт был слабо выражен. Поющий самец отмечен 22 мая. В гнездовое время не встречен. В условиях ХМАО в конце августа – первой половине сентября идёт осенняя миграция варакушки. Нами встречены одиночные птицы, державшиеся в кустарнике около озера Мевтылор по буграм болот.

Turdus atrogularis. Чернозобый дрозд гнездится в нашем регионе, предпочитая смешанные леса. На территории водно-болотного угодья «Нумто» мы отмечали только поющих самцов на пролёте в мае у озера Мевтылор. В другое время мы этих дроздов не видели.

Turdus pilaris. Гнездящийся вид. В ходе весенней миграции это обычная птица, которую встречали у посёлка Нумто и озера Мевтылор. В гнёздах, найденных в июне в ручьевом берёзовом криволесье в

окрестностях озера Ай-Васынглор, были птенцы. В гнезде, найденном 15 июня, самка обогревала 4 птенцов. Кроме птенцов в гнезде было 1 неоплодотворённое яйцо. В другом гнезде, найденном 16 июня, 2 птенца покинули гнездо, а 3-й имел уродства, не совместимые с самостоятельным проживанием вне гнезда. Скорее всего, в дальнейшем он погиб. В конце августа в окрестностях озера Мевтылор отмечена стая из 10 рябинников, подыскивающая место для дневной остановки.

Turdus viscivorus. Статус не определён. Местное население дерябу не знает. Л.Г.Вартапетов (1998) относит его к группе весенне-летних залётных и кочующих видов, ссылаясь на И.Н.Шухова (1915). Нами поющие самцы дерябы отмечены у озера Мевтылор (19 мая 2005) и в окрестностях посёлка Нумто (21 мая 2005).

Parus montanius. Гнездящийся вид. Весной и в первой половине лета пухляк был достаточно обычен в окрестностях озера Мевтылор. Однако во второй половине лета 2004 года его здесь не было, хотя в 2 км от озера в ручьевом кедряче были встречены две птицы. В других точках не отмечен.

Parus cinctus. Гнездится. В середине мая встречалась редко, возможно, из-за уже начавшегося гнездования. Летом сибирская ганчка встречена нами в стае с поползнем и пухляком. Во второй половине лета 2004 года в ходе послегнездовых кочёвок встречалась регулярно.

Sitta europaea. Немногочисленный гнездящийся вид. Поющий самец отмечен в мае у озера Мевтылор. В июне здесь встретили пару в стае с пухляками и сибирскими ганчками. Во второй половине лета как в лесу, так и на болоте нам встречались только одиночные птицы.

Fringilla montifringilla. Обычный гнездящийся вид. В мае юрки летели как по одному, так и небольшими группами до десяти птиц. Одновременно с пролётом шло распределение местных пар по гнездовым участкам, поэтому численность юрка была выше, чем в первой половине лета. С началом послегнездовых кочёвок численность вновь начала расти. В конце августа чаще всего встречались одиночные юрки, лишь однажды отмечена группа из трёх.

Spinus spinus. Статус не определен. Парк Нумто находится за пределами гнездовой части ареала чижа. Тем не менее, 26 августа нами отмечена одна птица севернее озера Мевтылор.

Acanthis flammea. Северные территории ХМАО входят в область гнездования чечётки, но нами отмечены только одиночные особи, как на весеннем, так и на осеннем пролёте.

Pinicola enucleator. Немногочисленный гнездящийся вид. Поющий самец отмечен 20 мая у озера Мевтылор. 20 июня здесь встречена самка, собиравшая корм для птенцов.

Loxia curvirostra. Гнездящийся инвазионный вид. В последние годы из-за низкого урожая ели нигде в округе высокой численности не

достигает. Весной и летом нами не отмечен. Лишь в ходе послегнездовых кочёвок в июне и в конце августа небольшие стаи из 3 и 5 еловиков появлялись у озера Мевтылор.

Loxia leucoptera. Северные территории ХМАО входят в область гнездования белокрылого клеста, но, как и клёст-еловик, из-за низкого урожая хвойных он высокой численности не достигает. Нами отмечены пара и одиночные птицы у озера Мевтылор.

Emberiza schoeniclus. Гнездящийся вид. На весеннем пролёте летит небольшими группами по 1-3 и встречается практически повсеместно. Пояские самцы отмечены в прибрежных зарослях ив у посёлка Нумто (май-июнь) и в окрестностях озера Ай-Васынглор (июнь). Во второй половине лета с началом послегнездовых кочёвок и осеннего пролёта в стайках встречается до 3-7 птиц.

Emberiza pusilla. Обычный гнездящийся вид. В озёрно-болотной системе Нумто в конце августа достигает высокой численности. Основной предпочитаемый биотоп – ерники. На конец августа приходится время осенней миграции. Овсянки-крошки встречались по 1-3 особи, но по сравнению с другими видами гораздо чаще.

Calcarius lapponicus. Пролётный вид. Гнездится в Субарктике. Оценить численность не было возможным, так как отмечены голоса птиц, мигрирующих ночью и поздним вечером. На дневных остановках лапландский подорожник не отмечен. По всей видимости, район озера Нумто эти птицы проходят транзитом.

Plectrophenax nivalis. Пролётный вид. Гнездится в Арктике. Весенняя миграция идёт с конца марта до начала мая, в зависимости от хода температур. Наши полевые работы в мае захватили только окончание пролёта. Осенью пуночка летит поздно, в октябре – начале ноября, когда наши работы уже были завершены.

Литература

- Вартапетов Л.Г. 1998. Птицы северной тайги Западно-Сибирской равнины. Новосибирск: 1-327.
- Гашев С.Н. 1998. К орнитофауне природного парка «Нумто» // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: 31-35.
- Гынгазов А.М., Миловилов С.П. 1977. Орнитофауна Западно-Сибирской равнины. Томск: 1-352.
- Ильина И.С., Лапина Е.И., Лавренко Н.Н., Мельцер Л.И., Романова Е.А., Боговаленский Б.А., Махно В.Д. 1985. Растительный покров Западно-Сибирской равнины. Новосибирск: 1-251.

